



手术资料

泪管塞置入术 Insertion of Lacrimal Plug

简介


泪管塞是一粒微型(比米粒还小)的医疗装置,将它放进泪管后可防止排出过量泪水,可使眼睛保持湿润。

治疗效果

若眼药水未能有助缓解干眼的症状时,泪管塞便可防止慢性干眼症。

过程

1. 可在局部或毋须麻醉下进行;
2. 泪管塞可放进上眼睑、下眼睑或上下眼睑;
3. 医生会先检查泪小点以决定采用哪种类型及尺寸的泪管塞,然后使用仪器扩张泪小点以助放入泪管塞;
4. 随后用即弃工具协助放入泪管塞。



图片来源:
<https://basirclinic.com/en/wp-content/uploads/2018/10/Punctal-Plug1-1.jpg>

可能出现的风险及并发症

1. 过敏反应
2. 眼睑感染
3. 传染性结膜炎
4. 泪眼
5. 形成过剩组织
6. 泪管塞移位或意外掉出来
7. 硬性或非永久性的泪管塞掉出或丢失
8. 泪管塞滑出泪管外的其他部位(不常见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善,仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症,患者明白后便须签署同意书。

手术后须知

1. 完成手术后数小时,轻微眼部不适属正常反应,随后会逐渐减退。
2. 完成手术后便可实时恢复正常活动。
3. 如有任何眼部不适及有异常分泌物,请联络医生摘除或更换泪管塞。
4. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

