



手术资料

脓疮切开及引流术 Abscess Incision and Drainage

简介


脓疮由脓液积聚而成，伴有红肿或发炎组织，在身体控制感染时出现，会形成硬块使患者感到疼痛。脓疮切开及引流术是一项把脓疮切开，将受感染的脓液排出的手术。

治疗效果

此手术有助排出受感染的脓液，并促进伤口愈合。

手术过程

1. 手术可在局部或全身麻醉下进行；
2. 在脓疮上的皮肤切口；
3. 引出脓液；
4. 用生理盐水或消毒液清洗脓腔；
5. 根据脓疮的状况，脓腔可能会用敷料填充，引出可能余下的脓液；
6. 用纱布覆盖伤口。



图片来源：
<https://marmed.com/products/derma-stent/>

可能出现的风险及并发症

1. 伤口疼痛
2. 伤口出血
3. 疤痕
4. 复发

不常见的风险:

脓疮附近的重要组织如血管或神经受损

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防伤口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 如脓疮较大或位置较深，可能须要接受超声波或其他医学影像检查。
5. 如用全身麻醉进行手术，可能须要接受常规检验，例如血液检验、心电图和肺部 X 光。
6. 术前 6 小时禁止饮食(根据情况)。
7. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
8. 手术前请先排清小便。

手术后须知

1. 手术后的短时间内，请尽量避免伤口受到过度拉扯及活动，以防伤口出血。
2. 伤口用纱布保护并吸收渗液。伤口可能会用特别的敷料填充，以防脓液再积聚及促进伤口愈合。请保持敷料清洁干燥。医生及护士会指导患者如何护理伤口。
3. 可即日出院。

出院后注意事项

1. 手术后及伤口愈合期间，患者可能会感到疼痛及不适，如有需要，可服医生处方止痛药。
2. 按医生指示，伤口完全愈合前，避免进行剧烈活动及运动。
3. 如伤口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、渗脓、渗血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知