仁安醫院
UNION HOSPITAL

請掃描以下二維碼以獲取電子檔案。

程序資料

胸膜組織檢查
Pleural Biopsy

簡介

胸膜組織檢查是一項抽取小塊胸膜組織的程序，將抽出的組織檢驗，診斷及決定治療方案。檢查的過程會使用超聲波或電腦掃描，以確定針落在正確的位置。胸膜組織檢查也可在胸腔鏡協助下進行，醫生在整個抽取組織的過程，可透過內視鏡觀察病人胸膜腔的情況。



圖片來源:
https://content.healthwise.net/resources/14.0/en-us/media/medical/hw/acm2526_460x300.jpg

預期成效

取出的組織由病理學家檢驗，作組織學評估。

程序過程

1. 此程序可在局部麻醉(超聲波或電腦掃描輔助)或全身麻醉(以胸腔鏡輔助)下進行；
2. 用超聲波或電腦掃描確定落針位置；及/或
   使用胸腔鏡檢查胸膜腔的情況：
   i. 在胸腔開一至兩個小切口；
   ii. 將胸腔鏡經小切口入胸膜腔。
3. 取得胸膜組織：
   用超聲波或電腦掃描輔助
   i. 把針經胸腔刺入，放進胸膜腔抽取胸膜組織。
   用胸腔鏡輔助
   ii. 將內視鏡專用儀器從小切口放入，並抽取胸膜組織。
4. 步驟 3 可能需要重複進行三至四次，以便取得足夠的胸膜組織。
5. 穿刺位置以無菌敷料覆蓋。
6. 把抽出的胸膜組織送往病理部檢驗。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染
2. 血胸 (血液積聚在胸腔內)
3. 氣胸 (空氣積聚在胸腔內，如徵狀嚴重，可能需要放置導管作胸腔引流)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物，及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
3. 可能需要進行肺部 X 光檢查。病人如正在懷孕或懷疑可能已懷孕，請告知醫生和護士。
4. 可能需要檢查全血球計數和凝血功能。按需要於程序前糾正凝血問題。
5. 如有需要，請在程序前 6 小時禁止飲食。
6. 如有需要會在手上置入靜脈注射導管。
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 程序前請先排清小便。

程序後須知

1. 可按指示恢復正常飲食。
2. 可能需要進行 X 光檢查。
3. 24 小時後，可恢復正常活動。數天內，請勿做劇烈活動。
4. 請保持傷口及敷料清潔乾爽。

傷口護理

1. 手術後會用消毒紗布覆蓋傷口，請保持敷料乾爽。
2. 如有需要，醫生會安排清洗傷口。
3. 可如常淋浴(如使用防水敷料)，其後請保持傷口清潔及乾爽。

出院後注意事項

1. 數天內，檢查部位可能會感到疼痛，可按照醫生指示服用止痛藥。
2. 傷口的敷料通常可於 48 小時後移除，請按醫生指示護理傷口。
3. 如出現呼吸困難、傷口疼痛增加或腫脹、流出血液或分泌物、胸痛、咳血、寒顫、發熱(體溫 38°C 或 100.4^{o}F 以上)等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信會逐漸康復，並祝生活愉快！

若閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生跟進。

_____

_____

_____

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL