仁安醫院
UNION HOSPITAL

请扫描以下二维码以获取电子档案。

检查资料

胸膜组织检查
Pleural Biopsy

简介

胸膜组织检查是一项抽取小块胸膜组织的程序，将抽出的组织检验，诊断及决定治疗方案。检查的过程会使用超声波或电脑扫描，以确定落针的正确位置。胸膜组织检查也可在胸腔镜协助下进行，医生在整个抽取组织的过程，可透过内视镜观察患者胸膜腔的情况。



图片来源:
https://content.healthwise.net/resources/14.0/en-us/media/medical/hw/acm2526_460x300.jpg

预期效果

取出的组织由病理学家检验，作组织学评估。

检查过程

1. 检查可在局部麻醉(超声波或电脑扫描辅助)或全身麻醉(以胸腔镜辅助)下进行；
2. 用超声波或电脑扫描确定落针位置；及/或
   使用胸腔镜检查胸腔的情况：
   i. 在胸腔切一至两个小切口；
   ii. 将胸腔镜经小切口进入胸膜腔。
3. 取得胸膜组织：
   用超声波或电脑扫描辅助
   i. 把针经胸腔刺入，放进胸膜腔抽取胸膜组织。
   用胸腔镜辅助
   ii. 将内视镜专用仪器从小切口放入，并抽取胸膜组织。
4. 步骤 3 可能需要重复进行三至四次，以便取得足够的胸膜组织。
5. 穿刺位置用无菌敷料覆盖。
6. 把抽出的胸膜组织送往病理部检验。

可能出现的风险及并发症

1. 伤口感染
2. 血胸 (血液积聚在胸腔内)
3. 气胸 (空气积聚在胸腔内，如症状严重，可能需放置导管作胸腔引流)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
3. 可能需要进行肺部 X 光检查。患者如正怀孕或怀疑可能已怀孕，请告知医生和护士。
4. 可能需要检查全血球计数和凝血功能。按需要在检查前纠正凝血问题。
5. 如有需要，请在检查前 6 小时禁止饮食。
6. 如有需要会在手上置入静脉注射导管。
7. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
8. 检查前请先排清小便。

检查后须知

1. 可按指示恢复正常饮食。
2. 可能需要进行 X 光检查。
3. 24 小时后，可恢复正常活动。数天内，请勿做剧烈活动。
4. 请保持刀口及敷料清洁干燥。

刀口护理

1. 手术后会用消毒纱布覆盖刀口，请保持敷料干燥。
2. 如有需要，医生会安排清洗刀口。
3. 可如常淋浴(如使用防水敷料)，其后请保持刀口清洁干燥。

出院后注意事项

1. 数天内，检查部位可能会疼痛，可按照医生指示服止痛药。
2. 刀口的敷料通常可于 48 小时后摘掉，请按医生指示护理。
3. 如出现呼吸困难、刀口疼痛增加或肿胀、出血或有分泌物、胸痛、咳血、寒颤、发烧(体温 38°C 或以上)等，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

_____

_____

_____

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL