

# 检查资料

请扫描以下二维码以 获取电子档案。



# 支气管镜检查 Bronchoscopy

## 简介

支气管镜检查是将一条细而柔软的内视镜,经口腔或鼻腔放入 气管及支气管,以观察及检查患者肺部的主要气道。有需要时, 医生可用仪器抽取活组织检验及治疗。

## 适应症:

- 1. 治疗上的应用
  - 取出气管内异物
  - 止血
  - 吸走积聚在气管内的分泌物
- 2. 诊断上的应用
  - 咳血
  - 颈淋巴肿胀
  - 长期咳嗽
  - 吞咽困难
  - 声音沙哑
  - 呼吸困难、气喘
  - 长期胸痛
  - 胸部 X-光检查结果异常

图片来源: https://www.lhsc.on.ca/thoracic-surgery/thoracic-surgery-83

## 治疗效果

根据不同的适应症而定。通过检查医生可观察肺及呼吸道内部做出诊断。如果需要,医生可从肺部取出黏液或组织进行活检。此程序也可以用来去除异物及止血。

## 检查过程

- 1. 检查期间,医护人员会密切监察患者的血压、脉搏及血含氧量等。
- 2. 一般会安排患者采用仰卧的姿势。
- 医生会在患者的鼻腔或咽喉喷入局部麻醉剂,以缓解放置内视镜时的不适。如有需要,也可 经静脉注射镇静剂、监测麻醉或全身麻醉。
- 4. 把内视镜通过口腔或鼻腔放入气管及支气管,可观察肺部情况。
- 5. 如有需要,医生会抽取肺组织作进一步检验。
- 检查期间,气道可能会受到刺激而引致咳嗽。

### 可能出现的风险及并发症

- 1. 心律不齐
- 2. 气胸
- 3. 咳血
- 4. 呼吸道感染
- 5. 肺部感染
- 6. 支气管痉挛
- 7. 损坏牙齿
- \*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善,仍有出现并发症的风险。

### 检查前的准备

- 1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症,患者明白后便须签署同意书。
- 2. 现正或怀疑怀孕的女士,请在检查前告知医生。
- 3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物,及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物,例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药,例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药,请尽早通知医生。
- 4. 患者可能需要接受相关的检查,如血液测试、心电图及胸部 X 光检查。
- 5. 检查前6小时禁止饮食。
- 6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等),换上手术衣。
- 7. 检查前请先排清小便。

## 检查后须知

#### 一般情况

- 1. 麻醉后可能会感到嗜睡或眩晕,首数小时应卧床休息。
- 2. 若感到疼痛或呼吸急促,请通知医护人员。
- 检查后的一段时间内,可能会出现轻微咳嗽、嗓子疼、沙哑及痰中带血的现象。
- 4. 抽取肺组织的患者需接受胸部 X-光检查。
- 5. 通常可即日或翌日出院,高危患者可能需要留院进一步观察出血或气胸等并发症。

#### 饮食

麻醉药作用消退后,便可按指示恢复正常饮食。

## 出院后注意事项

- 1. 如于检查当天出院,请勿在检查当天驾驶、操作机器或签署法律文件。
- 24-48 小时内请保持充足休息。
- 3. 如进行过抽取肺组织检验,数天内咳嗽时出现血丝属正常现象。
- 如出现呼吸急促、大量咳血、呕吐、寒颤或发烧(体温高达 38℃或以上)等,请即联络主治医 生或回院治疗。
- 5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑,请联络主治医生。
经过医生的悉心治疗,相信您会逐渐康复。
若您阅读此章程后有任何查询,请记下相关问题,以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好!

#### 由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供參考,详情请向主诊医生查询 本院保留一切删改此章程之权利,而不作另行通知

