

耐药性金黄色葡萄球菌除菌疗程

除菌疗程

医生会处方以下的外用除菌疗程(如您对有关药没有禁忌症)：

(一) 4% Chlorhexidine Gluconate 消毒皂液(Microshield 4%)

- 洗澡：每日一次，把消毒液涂满全身，连续用五天；及
- 洗头：第一、第三及第五天涂在头发及头皮上。

使用方法：把消毒皂液涂在全身、头发及头皮上一分钟后用清水冲净。

(二) 2% Mupirocin 药膏(Bactroban 或其他含有同样有效成分的药)/10% Betadine Antiseptic Ointment 药膏

- 涂在两侧鼻孔，每日两次，连续用五天。

使用方法：挤出适量(如火柴头般大小)的药膏，然后把药膏涂在其中一侧鼻孔内，在另一侧鼻孔重复以上步骤；再用拇指及食指捏住两侧鼻孔，并前后移动手指按摩，使药膏能均匀地涂在鼻孔内。若有需要，可用棉花棒协助涂药膏。患者的鼻咽和嗓子等部位可能会感觉到药膏的味道，这属正常现象。

注：根据药物生产商指示：

- 一般不建议两个月以下婴儿使用 4% Chlorhexidine Gluconate 消毒皂液。
- 一般不建议两岁以下儿童使用 10% Betadine Antiseptic Ointment 药膏。

注意事项

上述药品(4% Chlorhexidine Gluconate 消毒皂液及 2% Mupirocin 药膏/10% Betadine Antiseptic Ointment 药膏)皆只供外用，请勿吞服，并应放在儿童接触不到的地方。

(一) 4% Chlorhexidine Gluconate 消毒皂液/Microshield 4%

- 避免接触眼睛及身体黏膜表面，如口腔黏膜、鼻黏膜。如本药不慎接触到眼睛，请用快速流动的水冲洗。如不慎意外接触到黏膜部位，也应用清水冲洗。
- 少数人可能会对本药有过敏反应，如发现有刺激性皮肤炎的现象，请立即停用并求诊。
- 请勿将本药与肥皂同时使用。
- 含次氯酸钠(Sodium Hypochlorite)的漂白水可能会使曾接触本药的纺织品或衣物着色。

(二) 2% Mupirocin 药膏/Bactroban/ 10% Betadine Antiseptic Ointment 药膏

- 只供是次除菌用，使用者不要保留剩余的药供日后使用或作其他用途，否则会引致细菌的抗药性和治疗失效。

资料由仁安医院提供
以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知