

地址：香港沙田大圍富健街18號仁安醫院大樓2樓

電話：2608 3211

傳真：2608 2330

網址：www.unionpac.org

電郵：pac@union.org

交通設施 Traffic Facilities

本院設有免費穿梭巴士，行走本院及大圍港鐵站。

Free Union Hospital Shuttle Buses run between the Hospital and Tai Wai MTR Station.

專線小巴 minibus : 68K (由沙田及大圍港鐵站開出)

(From Shatin and Tai Wai MTR Stations)

公共巴士 buses : 46P, 46X, 80, 80P, 85B, 87B, 89B, 249X, 281M, 286X, 287X



LOOK YOUR

BEST
胸部塑形



Medical Specialists
You Can Count On



Accredited by The Australian Council on Healthcare Standards since June 2010



ISO 9001:2008 FS 66763

CCM / PAC(B)1608

仁心、安心、貼您心

Caring · Reliable · Empathetic






服務範圍

- 隆胸手術
 - 植入物放入
 - 自體脂肪轉移
- 乳房提升
 - 乳頭修飾/美化
 - 乳房縮小

隆胸手術 進行隆胸手術時，醫生需要透過從切口中放入填塞物，來達至胸部增大的效果。亞洲女性多數以腋下、乳暈邊沿、乳房邊沿位置作切口，傷口可以少於一吋。矽膠是常用的填塞物物料，質感真實，應用較為普遍。傳統的隆胸手術會在胸部肌肉上放入矽膠，而目前的手術則改為在肌肉內放入，令效果更自然。


傳統的隆胸手術會在胸部肌肉上放入矽膠。

在胸部肌肉內放入矽膠，效果更為自然。



新一代的水刀抽脂自體脂肪移植 **自體脂肪轉移** 技術，比傳統的乳房重塑手術創傷性較低，復原比較快。其30度角噴出的扇形水柱能溫和有效地將脂肪剝離同時抽出，保留周邊神經、血管與淋巴管，特別適用於自體移植。而移植後的脂肪效果自然，存活率高達70-80%。

手術後胸部大小是否與身型比例相稱是至為重要的，在手術前進行準確的評估，以個人的身高、胸圍、雙肩水平、肋骨結構、乳頭高低、乳暈大小、乳房張力和對稱性等作為考慮，有助提升手術後的滿意度。在亞洲女性常用矽膠容量為175立方厘米至300立方厘米。隆胸手術對女性日後的哺乳是不會有影響的，也不會提高患乳癌的機會。



乳頭修飾/美化 除了乳房本身的形狀、大小會影響視覺上的美觀與否之外，其實乳頭本身的形狀、色澤、大小也會影響胸部整體的美觀性。一般人的乳頭是向外突起1厘米以下，若乳頭過份突出、過大或凹陷都會影響外觀，一般情況都能以局部麻醉手術來改善，但手術後乳頭的感覺或會受到影響。另外，許多婦女在懷孕期間乳暈面積都會因乳房擴張而變大，並往往會因受到荷爾蒙的影響令顏色變深。透過外科手術，可將多餘乳暈切除，令乳暈回復適中的大小，另可利用激光或藥膏來減淡乳暈的顏色。

隨著年齡增長、生育及減肥後，乳房組織都會鬆弛而下垂，乳房提升手術可將鬆弛組織拉緊，令下垂的乳暈提升至適當的高度，回復美觀的乳房曲線。

乳房提升